



Trapianto di grasso autologo o “lipofilling” (ad esempio del seno e del viso)

Descrizione

Prelievo di tessuto adiposo (grasso sottocutaneo) da zone del corpo predefinite (cosce esterne/interne, fianchi, addome) tramite liposuzione al fine di un trattamento di riempimento e correzioni di cicatrici retratte o di aree del corpo e del volto con carenza di volume.

Narcosi

Anestesia locale o generale (a seconda della regione e della superficie).

Durata

Variabile da 1 a 2 ore a seconda dei casi.

Degenza

Solitamente ambulante (Ospedale di giorno, “day hospital”).

Inabilità lavorativa

1-2 settimane per un lavoro d’ufficio, 4 settimane per un lavoro che implica un maggiore impegno fisico (il rilascio di un certificato medico NON è permesso nei casi a valenza prettamente estetica).

Ritorno alla vita sociale

Subito dopo l’intervento.

Comportamento post-operatorio

La cura della persona con doccia può avvenire dal secondo/terzo giorno post-operatorio.

Dopo l’intervento chirurgico andrà indossata una guaina compressiva nella regione di prelievo del grasso per circa 6 settimane, 24 ore al giorno per le prime due settimane, mentre per le successive 4 basterà indossarlo solo durante il giorno.