



Ricostruzione del seno ibrida/composita

Descrizione

Una particolare tecnica chirurgica è la cosiddetta “espansione inversa”. Questa tecnica prevede in un primo tempo l’utilizzo di un espansore tissutale. Una volta raggiunta l’espansione desiderata, si procede con un secondo intervento che prevede anziché la sostituzione dell’espansore con una protesi definitiva un suo parziale svuotamento ed il riempimento del volume tissutale mancante con del grasso autologo prelevato in genere dall’addome o dalle cosce (trapianto di grasso autologo, “lipofilling”). Questo tipo di intervento verrà ripetuto a seconda delle necessità dopo ca. 3 mesi. In genere sono necessarie 3-5 sedute per raggiungere il volume desiderato.

Narcosi

Anestesia generale.

Durata

Variabile da 1 a 4 ore a seconda che sia unilaterale o bilaterale..

Degenza

3-4 giorni.

Inabilità lavorativa

2 settimane per un lavoro d’ufficio, 4-6 settimane per un lavoro che implica un maggiore impegno fisico.

Ritorno alla vita sociale

7-10 giorni.

Comportamento post-operatorio

La cura della persona con doccia può avvenire dal secondo/terzo giorno dopo la rimozione dei drenaggi. Dopo l’intervento chirurgico andrà indossato un reggiseno compressivo per circa 6 settimane, 24 ore al giorno per le prime 2 settimane, mentre per le successive 4 basterà indossarlo solo durante il giorno. Il reggiseno può essere o meno associato a una banda elastica con chiusura in velcro.