

Servizio di radiologia diagnostica ed interventistica		ETICHETTA EOC
Primario: Dr. med. F. Del Grande Viceprimario: Dr.ssa med. S. Tschuor-Costa Sede: <input type="checkbox"/> Civico Tel. 091 811 60 91 Fax 091 811 60 90 <input type="checkbox"/> Italiano Tel. 091 811 60 91 Fax 091 811 76 82		

Richiesta per esame radiologico

IMPORTANTE: INVIARE CON IL PAZIENTE GLI ESAMI RADIOLOGICI PRECEDENTI

Nome cassa malati:	Nome assicurazione:	SUVA <input type="checkbox"/>
		No.

Cognome: Nome: Data di nascita: Indirizzo: Telefono:	Data esame: Ora:
--	-------------------------

INDAGINE RICHIESTA:	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:	
	Allergia ai mezzi di contrasto:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
DATI CLINICI:	Creatinina:	del:
	GFR:	del:
	Diabete:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Metformina:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Gravidanza:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Data ultime mestruazioni:	
	Pace Maker:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Quick:	del:
PTT:	del:	
Trombociti:	del:	

QUESITO CLINICO:	Medico richiedente (Timbro, firma e numero tel.)
-------------------------	---

PREPARAZIONE AGLI ESAMI

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al personale di radiologia

Angiografia, PTA, interventistica complessa

- Il mattino dell'esame si può bere solo the o caffè.
- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) 4 ore prima dell'esame.
- Metformina: sospendere 48 ore prima dell'esame se GFR < 60 ml/min (vedi direttiva specifica "Metformina").
- **Esami richiesti: Quick (minimo 40%), PTT, Trombociti, Creatinina, GFR**
(se GFR < 60 ml/min vedi direttiva specifica "Insufficienza renale").
- Per i pazienti ambulatori degenza post-esame circa 6 ore.
- Dopo l'esame ASTENERSI dal GUIDARE per tutto il giorno: rientro a domicilio con guidatore altri che il paziente.
- Esami speciali: seguire direttive specifiche.

Artrografia (convenzionale, artro-TAC, artro-RM) e infiltrazioni

- Nessuna preparazione.
- Dopo l'esame ASTENERSI dal GUIDARE per tutto il giorno: rientro a domicilio con guidatore altri che il paziente.

Clisma opaco monocontrastato

- Nessuna preparazione.

Colonoscopia virtuale

- Seguire direttive specifiche.

Defecografia, Defeco RM

- Nessuna preparazione. Svuotare la vescica 1 ora prima dell'esame.

Mammografia e Mammo-RM

- Donne in età fertile: esame dal 5° al 14° giorno d all'inizio delle mestruazioni.

Mielografia, Radicolografia

- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) 4 ore prima dell'esame. Degenza post-esame circa 6 ore.
- **Esami richiesti: Quick, PTT, Trombociti.**

Puntura ago fine parti molli, tiroide e seno

- Nessun esame richiesto.

Puntura ago fine altri organi, biopsia e stereotassia

- **Esami richiesti: Quick, PTT, Trombociti.**

Sonografia

Addome

- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) 4 ore prima dell'esame. E' permesso bere acqua non gassata.
- VESCICA PIENA (bere 1 litro di acqua non gassata 1 ora prima dell'esame).

Reni e pelvi

- Digiuno non necessario. VESCICA PIENA.

Parti molli

- Nessuna preparazione.

Transito esofageo-gastrico

- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) dalla sera precedente.

Transito seguito dell'intestino tenue, entero-TAC e entero-RM

- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) 4 ore prima dell'esame.

TAC

Cerebrale, Torace, Addome:

- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) 4 ore prima dell'esame.
- Metformina: sospendere 48 ore prima dell'esame se GFR < 45 ml/min (vedi direttiva specifica "Metformina").
- **Angio TAC e perfusione:** Venflon verde 18G al braccio destro.
- **Altri esami:** Venflon rosa 20G al braccio destro.
- **Esami richiesti: Creatinina, GFR** (se GFR < 45 ml/min vedi direttiva specifca "Insufficienza renale").

Spazi vertebrali, osteoarticolari:

- Nessuna preparazione.

Risonanza Magnetica

- **Colangio-RM, RM-epatopancreatico, entero-RM:**
– DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) 4 ore prima dell'esame.
- **Defeco-RM:** Nessuna preparazione. Svuotare la vescica 1 ora prima dell'esame.
- **Altri esami:** DIGIUNO NON NECESSARIO.
- **Angio-RM e perfusione:** Venflon verde 18G al braccio destro.
Esami richiesti: creatinina e GFR
- **Altri esami:** Venflon rosa 20G al braccio destro.

ESAMI PEDIATRICI

Clisma opaco

- Nessuna preparazione.

Transito esofageo - gastrico

- Lattante digiuno da 4-6 ore.
- Bambino e ragazzo digiuno dalla sera precedente.

Cistografia

- Nessuna preparazione.

Sonografia addome o pelvica

- Vescica piena.
 - Digiuno non necessario salvo valutazione colecisti.
- ### TAC e RM
- Seguire direttive specifiche.