

Sede ORBV Bellinzona
 Sede OBV Mendrisio
 Sede ODL Locarno
 Sede ORL Lugano

Tel. 091 811 86 54/55
Tel. 091 811 32 54
Tel. 091 811 46 28
Tel. 091 811 60 91

Fax 091 811 86 56
Fax 091 811 30 31
Fax 091 811 46 23
Fax 091 811 60 90

Prevenzione di reazioni allergiche al mezzo di contrasto: schema per il Paziente

Gentile Paziente,

Lei sarà sottoposto ad un esame TAC o RM con iniezione di mezzo di contrasto.
Per prevenire una reazione allergica, dovrà eseguire la seguente premedicazione:

1. Una capsula di Prednisone da 50 mg il giorno che precede l'esame durante il pranzo.
2. Una capsula di Prednisone da 50 mg il giorno che precede l'esame durante la cena.
3. Una capsula di Prednisone da 50 mg 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame.

Presentarsi a digiuno nel servizio di radiologia, dove le verrà somministrato per via endovenosa un medicamento anti-allergico (Tavegyl).

Il medicamento anti-allergico (Tavegyl) ha un effetto sedativo, per questo consigliamo l'astensione dalla guida.

In caso di domande può rivolgersi al suo Medico curante oppure al servizio di radiologia.