



Chirurgia postbariatrica (dopo perdita massiccia di peso “massive weight loss”)

Addominoplastica

Descrizione

Riduzione dell'esuberato cutaneo e adiposo a livello dell'addome con riposizionamento dell'ombelico.

Narcosi

Anestesia generale.

Durata

Variabile dalle 2 alle 3 ore.

Degenza

3-5 giorni.

Inabilità lavorativa

1-2 settimane per un lavoro d'ufficio, 6 settimane per un lavoro che implica un maggiore impegno fisico (il rilascio di un certificato medico NON è permesso nei casi a valenza prettamente estetica).

Ritorno alla vita sociale

Subito dopo l'intervento.

Comportamento post-operatorio

La cura della persona con doccia può avvenire dal secondo/terzo giorno post-operatorio in base alla rimozione dei drenaggi. Dopo l'intervento chirurgico andrà indossata una guaina compressiva/fascia addominale per circa 6 settimane.

Liposuzione

Descrizione

Riduzione diffusa o localizzata di uno o più depositi grassosi che possono essere localizzati in varie parti del corpo.

Narcosi

Anestesia generale o anestesia locale con sedazione.

Durata

Variabile da 1 a 2 ore a seconda della quantità di tessuto adiposo da rimuovere e dalle zone da trattare.

**Degenza**

ambulante (Ospedale di giorno, "day hospital").

Inabilità lavorativa

Circa 1 settimana per un lavoro d'ufficio, 4 settimane per un lavoro che implica un maggiore impegno fisico (il rilascio di un certificato medico NON è permesso nei casi a valenza prettamente estetica).

Ritorno alla vita sociale

Subito dopo l'intervento.

Comportamento post-operatorio

La cura della persona con doccia può avvenire dal primo giorno post- operatorio. Dopo l'intervento chirurgico andrà indossata una guaina compressiva o pantaloni compressivi per un periodo variabile dalle 4 alle 6 settimane, continuativamente per 24 ore al giorno.

Rassodamento e ritensionamento cutaneo dopo perdita di peso**Descrizione**

Rimozione di cute e tessuto adiposo in esubero esitato dopo perdita importante di peso (mediante dieta o chirurgia bariatrica) in diverse aree del corpo (braccia, torace, addome, gambe, regione lombare).

Narcosi

Anestesia generale

Durata

Variabile da 2 a 6 ore a seconda della quantità di tessuto da rimuovere e dal numero delle aree da trattare.

Degenza

2-4 giorni.

Inabilità lavorativa

Dalle 2 alle 4 settimane per un lavoro d'ufficio, 6 settimane per un lavoro che implica un maggiore impegno fisico (il rilascio di un certificato medico NON è permesso nei casi a valenza prettamente estetica).

Ritorno alla vita sociale

Subito dopo l'intervento.

Comportamento post-operatorio

È richiesta una limitazione dei movimenti per i giorni successivi l'intervento chirurgico. La cura della persona con doccia può avvenire dal secondo/ terzo giorno dopo la rimozione dei drenaggi. Dopo l'intervento chirurgico andrà indossata una guaina compressiva o pantaloni compressivi per un periodo variabile dalle 4 alle 6 settimane, continuativamente per 24 ore al giorno.



Rassodamento delle braccia e delle cosce (brachioplastica e cruroplastica)

Descrizione

Rimozione di cute e tessuto adiposo in esubero da braccia e gambe esitato dopo perdita importante di peso. Al fine di ottimizzare i costi a carico della cassa malati e di ridurre il numero di interventi, brachioplastica e cruroplastica possono anche essere effettuati nella stessa seduta operatoria. A questi possono poi aggiungersi anche addominoplastica e liposuzione.

Narcosi

Anestesia generale

Durata

Variabile da 2 a 3 ore a seconda della quantità di tessuto da rimuovere.

Degenza

3-4 giorni.

Inabilità lavorativa

Dalle 2 alle 4 settimane per un lavoro d'ufficio, 6 settimane per un lavoro che implica un maggiore impegno fisico (il rilascio di un certificato medico NON è permesso nei casi a valenza prettamente estetica).

Ritorno alla vita sociale

Subito dopo l'intervento.

Comportamento post-operatorio

È richiesta una limitazione dei movimenti per i giorni successivi l'intervento chirurgico. La cura della persona con doccia può avvenire dal secondo/ terzo giorno dopo la rimozione dei drenaggi. Dopo l'intervento chirurgico andrà indossata una guaina compressiva nel caso delle brachioplastica o pantaloni compressivi nel caso della cruroplastica per un periodo variabile dalle 4 alle 6 settimane, continuativamente per 24 ore al giorno.

Mastopessi

Descrizione

Rimodellamento del seno mediante rimozione di parte del suo involucro cutaneo esterno ma senza rimozione di tessuto mammario, con un effetto "lifting" generale.

Narcosi

Anestesia generale

Durata

Variabile dalle 2 alle 3 ore.

Degenza

1-2 giorni.

**Inabilità lavorativa**

1-2 settimane per un lavoro d'ufficio, 4 settimane per un lavoro che implica un maggiore impegno fisico (il rilascio di un certificato medico NON è permesso per un intervento estetico).

Ritorno alla vita sociale

Subito dopo l'intervento.

Comportamento post-operatorio

La cura della persona con doccia può avvenire dal secondo/ terzo giorno post-operatorio, previa rimozione dei drenaggi (se presenti). Dopo l'intervento chirurgico andrà indossato un reggiseno compressivo per circa 6 settimane, 24 ore al giorno per le prime 2 settimane, mentre per le successive 4 basterà indossarlo solo durante il giorno.