

Tabella 1. Score di sanguinamento adattato secondo ISTH-BAT (Rodeghiero et al. J Thromb Haemost. 2010 Sep;8(9):2063-5)

Sintomi (fino al momento della diagnosi)	Score				
	0 <sup>s</sup>	1 <sup>s</sup>	2	3	4
Epistassi	Nessuno o banale	>5/anno o più di 10 minuti	Solo consultazione*	Imballaggio o cauterizzazione o antifibrinolitico	Trasf.sanguigna o sost.di fattori (utilizzo di componenti emostatici del sangue e rFVIIa) o desmopressina
Pelle	Nessuno o banale	Per contusioni ≥5 i (>1cm) in aree esposte	Solo consultazione*	Esteso	Ematoma spontaneo che richiede trasf.di sangue
Sanguinamenti da ferite minori	Nessuno o banale	>5/anno o più di 10 minuti	Solo consultazione*	Emostasi chirurgica	Trasf.sanguigna, sost.di fattori o desmopressina
Cavità orale	Nessuno o banale	Presente	Solo consultazione*	Emostasi chirurgica o antifibrinolitico	Trasf.sanguigna, sost.di fattori o desmopressina
Sanguinamenti gastrointestinali	Nessuno o banale	Presente (non associato a ulcera, ipertensione portale, emorroidi, angioidisplasia)	Solo consultazione*	Emostasi chirurgica o antifibrinolitico	Trasf.sanguigna, sost.di fattori o desmopressina
Ematuria	Nessuno o banale	Presente (macroscopico)	Solo consultazione*	Emostasi chirurgica, sostituzione ferro	Trasf.sanguigna, sost.di fattori o desmopressina
Estrazioni dentarie	Nessuno o banale	Segnalato nel ≤25%di tutte le procedure, nessun intervento**	Segnalato nel >25%di tutte le procedure, nessun intervento*	Ri-sutura o imballaggio o antifibrinolitico	Trasf.sanguigna, sost.di fattori o desmopressina
Chirurgia	Nessuno o banale	Segnalato nel ≤25%di tutte le procedure, nessun intervento**	Segnalato nel >25%di tutte le procedure, nessun intervento*	Emostasi chirurgica o antifibrinolitico	Trasf.sanguigna, sost.di fattori o desmopressina
Menorragia	Nessuno o banale	Solo consultazione* o cambiare l'assorbente ≥ogni due ore o coagulo e 'flooding' o PBAC score >100 <sup>#</sup>	Assenza dal lavoro/scuola >2/anno o Richiesta terapia antifibrinolitica o ormonale o terapia con ferro	Richiesta di trattamento combinato con fibrinolitici e ormono-terapia opresente da quando c'è il menarca e >12 mesi	Menorragia acuta richiedente ospedalizzazione o trattamento d'emergenza o Richiedente trasfusioni di sangue, sostituzione di fattori o Desmopressina o – Richiedente di curretage o ablazione endometriale o isterectomia
Post-parto	Nessuno/banale o nessun parto	Solo consultazione* o uso di syntocin o Lochia>6 settimane	Terapia con ferro o antifibrinolitici	Richiedente trasfusione sanguigna, sostituzione di terapia, Desmopressina o Richiedente di esami sotto anestesia e/o utilizzo di pallone uterino/ pacchetto per tamponamento dell'utero	Tutte le terapie richiedenti cure intense o interventi chirurgici (isterectomia, legatura dell'arteria iliaca interna, embolizzazione dell'arteria uterina, sutura uterina)
Ematomi muscolari	Mai	Post-trauma, nessuna terapia	Spontaneo, nessuna terapia	Spontaneo o traumatico richiedente Desmopressina o sostituzione di fattori	Spontaneo o traumatico richiedente intervento chirurgico o trasfusione sanguigna

**Tabella 1. Score di sanguinamento adattato secondo ISTH-BAT (Rodeghiero et al. J Thromb Haemost. 2010 Sep;8(9):2063-5)**

Ematrosi	Mai	Post-trauma, nessuna terapia	Spontaneo, nessuna terapia	Spontaneo o traumatico richiedente Desmopressina o sostituzione di fattori	Spontaneo o traumatico richiedente intervento chirurgico o trasfusione sanguigna
Sanguinamenti CNS	Mai	--	--	Subdurale, qualsiasi intervento	Intracerebrale, qualsiasi intervento
Altri sanguinamenti <sup>^</sup>	Nessuno o banale	Presente	Solo consultazione	Emostasi chirurgica, antifibrinolitici o terapia con ferro	Trasfusione sanguigna o sostituzione di fattori o Desmopressina

In aggiunta alle linee guida offerte nella tabella, è auspicabile riferirsi al testo per avere maggiori dettagli sulle istruzioni

<sup>§</sup>Distinzione tra 0 e 1 è di importanza critica. Score 1 significa che il sintomo è giudicato come presente dall'intervistatore nella storia del paziente, ma non è qualificabile come score 2 o più.

\*Solo consultazione: il paziente ha richiesto una valutazione medica ed è stato indirizzato ad uno specialista o gli è stata offerta un'indagine dettagliata di laboratorio

\*\*Esempio: 1 estrazioni/chirurgie sanguinamento risultante (100%): lo score da assegnare è 2; 2 estrazioni/chirurgie, 1 sanguinamento risultante (50%): lo score da assegnare è 2; 3 estrazioni/chirurgie, 1 sanguinamento risultante (33%): lo score da assegnare è 2; 4 estrazioni/chirurgie, 1 sanguinamento risultante (25%): lo score da assegnare è 1

<sup>#</sup>se già a disposizione al momento dell'anamnesi

<sup>^</sup>Include: sanguinamento del moncone ombelicale, cefaloematoma, ematoma delle guance causato durante l'allattamento al seno, emorragia congiuntivale o eccessivo sanguinamento a seguito di circoncisione o prelievo venoso. La loro presenza in età infantile, richiede, indipendentemente dallo score, un'indagine dettagliata.