



Midazolam (Dormicum®) in Cure Palliative specialistiche stazionarie

Farmaco	Diluizione e dosaggio per pompa siringa		
DORMICUM (POMPA SIRINGA) 50 mg = 10 ml 	1 fiala di Dormicum = 50 mg (10 ml) + 40 ml NaCl 0,9% = 50 ml (1 ml = 1,0 mg)		
	mg/24h	mg/h	ml/h
	12	0.5	0.5
	24	1.0	1.0
	36	1.5	1.5
	48	2.0	2.0
	60	2.5	2.5
	72	3.0	3.0
84	3.5	3.5	
96	4.0	4.0	
Osservazioni: - Per il raggiungimento di un tasso plasmatico stabile sono necessarie 2-3 h. Se si desidera un effetto più rapido, somministrare una dose di induzione secondo lo schema seguente: <ul style="list-style-type: none"> • 5 mg (fino a 10mg) s.c. in bolus oppure • 2-3 mg in 50 ml NaCl i.v. in 5-10 min. - Nel caso di somministrazione s.c. non superare i 5 ml/h (il riassorbimento deve essere rapido e costante per poter valutare l'effetto ed adattare il dosaggio secondo le necessità del paziente).			

Farmaco	Diluizione e dosaggio per Infusomat		
DORMICUM (INFUSOMAT) 50 mg = 10 ml 	1 fiala di Dormicum = 50 mg (10 ml) + 90 ml NaCl 0,9% = 100 ml (1 ml = 0,5 mg)		
	mg/24h	mg/h	ml/h
	12	0,5	1,0
	24	1,0	2,0
	36	1,5	3,0
	48	2,0	4,0
	60	2,5	5,0
	72	3,0	6,0
84	3,5	7,0	
Osservazioni: - Per il raggiungimento di un tasso plasmatico stabile sono necessarie 2-3 h. Se si desidera un effetto più rapido, somministrare una dose di induzione secondo il seguente schema: <ul style="list-style-type: none"> • 5 mg (fino a 10mg) s.c. in bolus oppure • 2-3 mg in 50 ml NaCl i.v. in 5-10 min. - Nel caso di somministrazione s.c. non superare i 5 ml/h (il riassorbimento deve essere rapido e costante per poter valutare l'effetto ed adattare il dosaggio secondo le necessità del paziente).			